

患者番号		記載日	
患者氏名		診療科	
生年月日		性別 男・女	記載者名

- 検査項目：造影CT  胸部  
 腹部  
 骨盤  
 その他（ ）

#### ヨード造影剤とは

画像検査のために体の中に投与するお薬で、通常、肘の静脈から投与します。ヨード造影剤を用いることにより、あなたの病気の診断や状態をより明らかにし、今後の治療に役立てられることが期待されます。

#### ヨード造影剤の副作用

ヨード造影剤で約3%の方に何らかの副作用が認められますが、多くは吐き気・嘔吐・熱感・かゆみ・発疹などの軽度のものです。まれに呼吸困難やショックといった重い副作用を生じることもあります。このような副作用で入院が必要になったり、後遺症が残ったりする頻度は約2.5万人に1人（0.0040%）と報告されています。また、非常にまれですが、副作用で死亡することもあり、頻度は約40万人に1人（0.00025%）と報告されています。

副作用は検査中や検査直後に起きることが多いですが、数時間から数日後に副作用（頭痛、発疹、かゆみ、吐き気、めまいなど）が起きることもあります。

副作用の危険性は、以前にヨード造影剤で副作用のあった方、気管支喘息の方、アレルギー体質の方では高くなります。また、甲状腺の病気のある方では、症状が悪化することがあります。腎臓が悪い方では、腎臓の働きを悪化させるおそれがあります。

ヨード造影剤を注射する時に体が熱くなることがありますが、正常な反応で心配ありません。通常、注射が終了すると同時に、次第に消失していきます。

#### 合併症

針を刺すことによって、刺した場所の痛みやしびれが検査後も持続することがあります。頻度は軽症を含めると6,000人に1人（0.017%）とされています。

また、まれに造影剤が血管外にもれ、腫れや痛みを起こすことがあります。

#### ヨード造影剤を使用しない場合の不利益

病変を発見しにくくなることや、病変の状態がわかりにくくなる場合があります。

もし副作用や合併症が起きても適切な処置を行えるような準備をして、検査を行っています。造影剤について不明な点がある方、造影剤を使用したくない方は、ご遠慮なく申し出てください。

なお、副作用や合併症が起きた場合の診療は、通常の保険診療となりますので御承知おきください。

#### 〈ヨード造影剤使用の同意書〉

私は患者様に上記事項について説明しました。 年 月 日

医療機関名

担当医氏名

私は、ヨード造影剤を用いた検査の目的や方法、危険性について説明を受けて理解した上で、ヨード造影剤を用いた検査を受けることに同意します。

年 月 日

患者氏名

代理人氏名

（続柄 ）