

# 一般消化器外科＜mFOLFOX6 + Cet療法＞（1コース14日）

薬品名	投与量	点滴時間・速度	day1	2	...	8	...	14
デキサメタゾン注 クロルフェニラミン注 パロノセトロン注	6.6mg 5mg 0.75mg	10分	↓					
デキサメタゾン注 クロルフェニラミン注 生理食塩液	6.6mg 5mg in 50mL	10分				↓		
セツキシマブ注 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> * in 250mL	120分*	↓			↓		
5%ブドウ糖液	50mL	フラッシュ	↓					
レボホリナート注 5%ブドウ糖液	200mg/m <sup>2</sup> in 250mL	2時間 (同時に投与)	↓					
オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	85mg/m <sup>2</sup> in 250mL		↓					
フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	400mg/m <sup>2</sup> in 50mL	フラッシュ	↓					
5%ブドウ糖液	50mL	フラッシュ	↓					
フルオロウラシル注**	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	↓	↓				

\*2回目以降、セツキシマブ注は250mg/m<sup>2</sup>として60分かけて投与する

\*\*加圧式医薬品注入器（携帯用持続注入ポンプ）を用いて投与（希釈液は生理食塩液を用いる）